

STADIAZIONE BRONJ

Stadio "0" - Lesione Precoce

Sarebbe costituito da pazienti in trattamento con NBP che presentano segni clinici aspecifici di malattia in assenza di esposizione ossea e di una accertata causa dento-parodontale.

Stadio "1" - Bronj focale

Presenza di almeno 1 segno clinico minore e con un addensamento osseo alla TC limitato al solo processo dento-alveolare della mandibola o del mascellare, con o senza altri segni radiologici precoci.

Segni clinici minori e sintomi: Alitosi, ascesso odontogeno, asimmetria mandibolare, dolore di origine dentale e osseo, esposizione ossea, fistola mucosa, mancata riparazione mucosa alveolare post-estrattiva, mobilità dentale a rapida insorgenza, parestesia/disestesia delle labbra, secrezione purulenta, sequestro spontaneo di frammenti ossei, trisma, tumefazione dei tessuti molli.

Segni TC: Ispessimento trasecolare, osteosclerosi midollare focale, con o senza ispessimento cesta alveolare e lamina dura, persistenza alveolo post-estrattivo, slargamento spazio parodontale.

Stadio "2" - Bronj diffusa

Presenza di almeno 1 segno clinico minore e con un addensamento osseo alla TC esteso al processo basale della mandibola o del mascellare, con o senza segni radiologici tardivi.

Segni clinici minori e sintomi: Come per Stadio 1

Segni TC: Osteosclerosi diffusa, con o senza fistola oro-antrale e oro-nasale, ispessimento del canale alveolare, reazione periostale, sequestro, sinusite.

Stadio "3" - Bronj complicata

Come in stadio 2, in presenza di uno o più dei seguenti:

Segni clinici minori: Fistola extra-orale, fuoriuscita di liquidi dal naso, mobilità preternaturale della mandibola con o senza occlusione conservata.

Segni TC: Fistola muco-cutanea, frattura patologica, osteolisi estesa al seno mascellare, osteosclerosi di zigomo e/o palto duro.